

Kariesz

- Multikauzális megbetegedés

Dentalis plakk

Típusok

- Sima felszíni kariesz
- Barázda és foramen coecum kariesz

Progresszió

- Fő fázisok:
 - korai white spot lézió
 - nem bakterialis kristály destrukció
 - üregképződés
 - bakteriális invázió

Kariesz

- ⦿ Caries incipiens (white spot)
- ⦿ Caries superficialis
- ⦿ Caries media
- ⦿ Caries profunda
- ⦿ Caries penetrans

Kariesz

:

- Ⓒ Caries rapida
- Ⓒ Caries tarda

Kariesz

-Primer

-Szekunder

Progresszió

Caries rapida, nursing bottle caries

A vizsgálat jelentősége

- Rákszűrés
- Dokumentáció és követés
- Megelőzés és dentális edukáció

Betegvizsgálat anamnézis

általános

- általános megbetegedések
- fertőző betegségek
- krónikus megbetegedések
- terhesség
- allergia
- egyéb.....

Fogászati anamnézis

- korábbi kezelések, műtétek
- gyökérkezelések
- fő tünet
- fájdalom (jellege, intenzitása, stb...)

Betegvizsgálat

- Extraoralis
- -megtekintés
- -tapintás

megtekintés

tapintás

Intraorális vizsgálat

Megtekintés

lámpa

nagyító

tapintás

kézzel

kézi műszerrel

kopogtatás

Szonda nyele

szenzitivitás teszt

Hideg, meleg, elektromos és tesztkavitás fúrása

RTG

Periapikális, ráharapásos, OPT

Instrumentarium

Tapintás

Arrested caries

Caries incipient, white spot

Smooth surface decay

Pit and fissure

Progresszió

Cement kariesz

Nem időben felismert approximalis kariesz

Szekunder kariesz

Szekunder kariesz

The diagnosis

- Secondary caries because of the proximal overhang

Rtg

electric testing

Diagnózis

- Egészséges ép fog
- White spot lézió
- Kariesz egészséges pulpával
- **Kariesz reverzibilis pulpitiszel**

Therapia

Konzervatív kezelés

- prevenció
- tömés

Endodoncia

- Gyökérkezelés

Kezelési sorrend

prioritás

FÁJDALOM MEGSZÜNTETÉSE

mély szuvasságok ellátása

preventív kezelések

karieszek ellátása

The management

- White spot lesion: may become arrested when remove the stagnation area. May remineralised by minerals from the saliva
- Early enamel lesion: remineralise use of fluoride and consumption of a less cariogenic diet. Later fissure sealant
- Dentin caries: remove all the infected tissue and it's replacement with some resistant material to obliterate the cavity and restore the natural form of the tooth

- a korai stádiumban fluoridált léziók kb 50% -a nem mutatja 3 éven belül a progresszió jeleit

Barázdázárás